



ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № ЛЛ0001532

Дата регистрации заказа:	12.01.2023 21:03	Дата взятия материала:	12.01.2023
Ф.И.О. владельца:	Зайцев Олег Николаевич	Дата выполнения:	19.01.2023 15:53
Вид животного:	Собака	Чип\клеймо:	
Порода:	лабрадор	Дата сверки чипа\клейма:	
Возраст (лет, мес.):	8,4	Пол:	М
Лечащий врач:		Кличка:	Бадди
		Заказчик:	
Материал:	стеклопрепарат	Метод:	Гистология

Результаты исследования:

Номер биопсии: Г005/23

Данные анамнеза: Информация получена со слов владельца.

Собака найдена на улице. При осмотре были выявлены опухолевые поражения по всему телу. Узлы подвижные, подкожные, безболезненные. Так же присутствуют образования на веках в виде цветной капусты, периодически кровоточат. Представленный материал - образование с ушной раковины. Предыдущее гистологическое заключение не предоставлено, по словам врача - рак сальных желез. Региональные лимфатические узлы не увеличены.

Вид материала: 1 стеклопрепарат с маркировкой С277-22

Микроскопическое описание:

Приподнимая и изъязвляя эпидермис, расширяя дерму, представлено умеренно отграниченное неинкапсулированное многодольчатое новообразование, дольки которого окружены умеренной фиброзной стромой и преимущественно состоят из плотноупакованных клеток резервной (базальной) дифференцировки. Данные клетки имеют маленький ободок эозинофильной цитоплазмы, нередко сливающейся между отдельными клетками; ядра средних размеров и округлой или овальной формы, имеющие нежный зернистый хроматин и 1-3 нуклеолы. Анизокариоз выражен слабо-умеренно. Митозов более 10 на 10 полей зрения при увеличении x400. Среди резервных клеток умеренно выявляются клетки себоцитарной дифференцировки полигональной и овально-округлой формы с обильной цитоплазмой, заполненной оптически-прозрачными вакуолями. Данные клетки имеют ядра средних размеров округлой формы, нежный сетчатый хроматин и 1-2 нуклеолы. Анизоцитоз и анизокариоз выражены умеренно. Среднее количество митозов в себоцитарных клетках до 1 в 10 полях зрения при увеличении x400. Соотношение резервных клеток к себоцитарным — 9:1. В толще опухоли многоочагово выявляются участки с плоскоклеточной потоковой дифференцировки. Многоочагово опухолевый рост расположен в менее 0,5 мм от краев биоптата.

Морфологический диагноз:

Эпителиома себоцитарных (сальных) желез.

Комментарий:

Эпителиома себоцитарной железы является эпителиальным новообразованием, берущим начало из резервных клеток себоцитарной (сальной) железы. Эпителиомы могут обладать инвазивным ростом и исключительно редко метастазировать. Главный метод лечения — хирургическое иссечение.

Врач КЛД, эксперт: Газин А.А.

Дата выдачи: 19.01.2023

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (код участника 10705)

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071



ВАЖНО!

1. Цитологические препараты сохраняются в лаборатории в течение 2х месяцев после оформления заявки, гистологические стеклопрепараты/гистоблоки 1 год.
2. Цитологическое исследование является скрининговым исследованием и окончательное заключение/диагноз ставится на основании гистологического/ИГХ исследования.
3. Возврат гисто/цитопрепарата заказывается отдельной услугой согласно прейскуранту.
4. Окончательный диагноз, назначение или тактика дальнейшего лечения определяется лечащим врачом.

Претензии по результатам анализа принимаются в течение 7 дней с даты готовности

Вопросы по исследованию pm@vetlab.ru

Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке <https://vetlab.ru/catalog/>

Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.